Return to School Form: 登園/登校許可証明書

保護者様記入欄 (Please fill in by parents.)

Class: Name:

下記の疾病で 年 月 日から療養中のところ、現在軽快し、他児への感染の恐れはないと思われますので、 年 月 日から登園/登校してよいことを証明します。

該当疾患に〇	Name of Illness 病名	Standard Period of Suspension of Attendance (Approximate) 出席停止期間の基準(目安)
	Influenza インフルエンザ	Until five days have passed after symptoms appeared, and two days (it is three days if a small child has) will pass after the fever ended. 発症した後5日を経過し、 <u>かつ</u> 、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
	Whooping cough / Pertussis 百日咳	Until a characteristic cough disappears, or until the medical treatment by the proper antibiotic preparation for five days is completed. 特有な咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	Measles 麻疹(はしか)	Until three days have passed since the fever ended. 解熱したあと3日を経過するまで
	Mumps / Epidemic Parotiditis 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	Until five days have passed and your child's general state becomes good, after the swelling of the period disappears. 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
	Rubella / German Measles 風疹(三日ばしか)	Until rashes disappear. 発疹が消失するまで
	Chicken pox 水痘(水ぼうそう)	Until all rashes scab over. すべての発疹が痂皮化するまで
	Pharyngoconjunctival fever (Pool fever) 咽頭結膜熱(プール熱)	Until two days have passed since any major symptoms disappeared. 主要症状が消退した後2日を経過するまで
	Meningococcal meningitis 髄膜菌性髄膜炎	
	Tuberculosis 結核	
	E. coli infection (bacterial infection causing intestinal hemorrhaging) 腸管出血性大腸菌感染症	
	Eidemic eratoconjunctivitis (Pink eye) 流行性角結膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis (Pink eye)	Until the school physician or another medical doctor determines that there is no risk of transmission based on the condition of the disease. 病状により学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
	急性出血性結膜炎	
	Streptococcal infection 溶連菌感染症 Hepatitis A ウイルス性肝炎 (A型)	
	Infectious Gastroenteritis 感染性胃腸炎	
	Mycoplasma Pneumonia マイコプラズマ感染症	
	Erythema infectiosum 伝染性紅斑 (りんご病) Herpangina ヘルパンギーナ	
	Hand-foot-and-mouth disease 手足口病	
	Impetigo 伝染性膿痴疹(とびひ)	
	Epidemic vomiting dairrhea 流行性嘔吐下痢症	

[登園/登校後の注意事項]

年 月 日